

Zoek-instructies latrines wasbeerhond

Latrines liggen in het bos of in andere dekking. In winter en voorjaar ligt er altijd een latrine binnen 20-50 (-100) m van een bewoond hol. Ze liggen echter ook her en der verspreid in het hele territorium, je kunt ze dus overal (toevallig) tegenkomen. Omdat de territoria naar verwachting nog erg groot zijn, heeft lukraak zoeken van latrines niet veel zin.

Het uitgangspunt van een zoekactie naar latrines kan dus het beste een hol zijn, van das of vos. Waarschijnlijk zitten wasbeerhonden het liefst in holen waar niet direct vossen of dassen in de buurt zijn; dus in verlaten burchten, in losse pijpen, in ongebruikte bijburchten enzovoort. Dus in een druk gebruikte dassenburcht zijn ze niet te verwachten en daar hoeft niet gezocht te worden naar latrines, tenzij er ongebruikte hoeken in grote dassenburchten zijn, of dichtbij liggende losse pijpen of kleine bijburchten.

Als wasbeerhonden in de winter een hol gebruiken, zijn er meestal niet veel sporen te zien. Pootafdrukken (maar die verschillen niet veel van die van vossen, ze zijn vooral rond) en losse zeer lange (10 cm) haren in het zand. Wasbeerhonden kunnen bij koude wekenlang ondergronds blijven en dan geen sporen achterlaten bij hun hol. Zoeken naar latrines heeft zin als er een of meer duidelijk open en belopen pijpen zijn die geen sporen van dassen vertonen; hetzij in de hoek van een grote dassenburcht, hetzij als aparte pijpen of bijburchten.

Voor het zoeken van een latrine moet dus een flinke oppervlakte worden afgezocht, een cirkel met straal 50 m is een flinke lap grond. Je hoeft alleen te zoeken op plekken waar je zelf ook kunt lopen, dichte begroeiing kun je overslaan. Het vergt dus veel meer tijd dan een inspectie van een dassenburcht op bewoning, naar schatting rond een uur per burcht.

Bij het vinden van een latrine: enkele foto's maken, details en overzicht met landschap. Coördinaten vastleggen. Doorgeven aan Jaap (zie onder). Onder geen beding de keutels aanraken en er ook niet met de neus boven hangen, in verband met het risico op besmetting met de vossenlintworm. Een ervaren onderzoeker zal zo snel mogelijk de latrine bezoeken en op de juiste wijze keutels verzamelen voor voedselonderzoek en onderzoek naar parasieten.

Voorjaar

In april en mei kunnen er jonge wasbeerhonden aanwezig zijn in een hol. Anders dan jonge vossen en jonge dassen lopen ze slechts een heel korte tijd het hol in en uit, namelijk slechts twee à drie weken; ze gaan namelijk zes weken na de geboorte al aan het rondzwerven met hun ouders, en slapen dan elke nacht op een andere plaats. In de drie weken dat ze buiten komen, laten ze ook hun sporen achter: er ontstaat op 1-5 meter afstand van de meest gebruikte ingang van het hol een latrine waar de kleine keuteltjes wat meer verspreid liggen dan bij de latrines van de volwassen dieren, en waar de vegetatie soms geel wordt door de urine. Jonge vossen poepen veel meer verspreid (losse keuteltjes) en meestal ontstaan er geen gele plekken in de vegetatie.

Bij het vinden van zulke sporen graag snel de bevindingen doorgeven, omdat de tijd voor verder handelen (vangen en merken van de jongen, bijvoorbeeld) heel kort is.

Van een duitse collega heb ik inmiddels begrepen dat de wasbeerhond erg gevoelig is rond zijn jongen. Ze verhuizen bij de minste storing. Dat betekent dat we bij de hollen waar ze zouden kunnen zitten heel voorzichtig moeten zijn. Houd een paar meter afstand, maak geen lawaai en praat niet. Dan is er waarschijnlijk minder kans dat ze verhuizen. Ze zijn wat dat betreft dus veel gevoeliger dan dassen. Probeer de status van het hol (belopen, dichtgevallen met blad, etc) dus van een paar meter afstand te beoordelen. Als er een latrine met keuteltjes van de jongen ligt, kun je die ook op een paar meter afstand zien; dat is het enige wat je wilt weten, maak foto en ga dan weg en geef je vondst door!

Jaap Mulder, 06-10708498, muldernatuurlijk@gmail.com

Latrine volwassen wasbeerhond



Latrine jonge wasbeerhonden pal naast een belopen hol

